

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 27-4-65 385586

BULLETIN TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION DU NORD-OUEST - Arras - Tél. 23.14
(SEINE-MARITIME, SOMME, PAS-DE-CALAIS, NORD)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, - Station d'Alertes Agricoles d'ARRAS.
C. C. P. : LILLE 57-01-67

ABONNEMENT ANNUEL
15 F

N° IV - Supplément n° 2
23 Avril 1965

AVERTISSEMENTS

TAVELURES DES FRUITS A PEPINS

CULTURES FRUITIERES

Les dernières pluies ont pu provoquer quelques contaminations bien que les températures aient été à la limite des possibilités d'infection. De plus, elles ont fortement amoindri la valeur de la garantie assurée par le dernier traitement en lessivant les produits. Le renouvellement de la protection doit donc être envisagé d'autant plus que des chutes de grêles ont parfois endommagé les arbres.

En conséquence,

Sur Pommier, intervenir du 25 au 27 avril sur les variétés ayant atteint ou dépassé le stade E₂ (boutons roses bien séparés) et couvrir les variétés plus tardives au fur et à mesure qu'elles atteignent ce stade. Ajouter à la bouillie un produit à base de D.D.T. pour lutter contre les chenilles et tordeuses et contre les charançons défoliateurs. Sur les variétés sensibles à l'Oïdium, ajouter un produit adéquat.

Sur Poirier, intervenir du 25 au 27 avril mais sans ajouter d'insecticide en raison du début de la floraison.

INFORMATIONS

BOTRYTIS DU FRAISIER

Prévoir 3 traitements à partir du stade bouton floral avec un produit à base de Captane à la dose de 250 grs de matière active/hectolitre ou de Thirame à la dose de 300 grs de matière active/hectolitre.

RAPPEL : framboisiers, groseillers, cassissiers.

H A R I C O T S

CULTURES LEGUMIERES

Dans les situations sensibles aux parasites, il y a intérêt à opérer un enrobage des semences avec un insecticide ; par exemple, pour 100 kgrs de semences : Dieldrine 30 grs ou Heptachlore 50 grs. L'adjonction d'un fongicide type Oxinate de cuivre ou T.M.T.D. ou Manèbe est toujours utile.

RAPPELS : Mouche du Chou

Sitone et Thrips sur Pois.

SEPTORIOSE DU CELERI

La protection des jeunes plants doit être assurée de façon répétée avec un fongicide organique de synthèse (Oxinate de cuivre, Manèbe, Doguadine, etc...)

LIMACES - ESCARGOTS

Ces ravageurs sont favorisés par le temps humide. L'épandage d'appâts à base de Meta aldéhyde donnent satisfaction.

GRANDES CULTURES

RAPPEL : Mèligèthes du Colza - En cas de réinfestation grave, prévoir un 2ème traitement par beau temps de préférence.

Le Contrôleur chargé des
Avertissements Agricoles,

R. DIVOUX

L'Inspecteur de la
Protection des Végétaux,

P. COUTURIER